

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน		
การใส่สายยางทางปาก(Orogastric tube intubation)		
ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	ล้างมือให้สะอาด จัดท่าผู้ป่วยนั่งหรือนอนศีรษะสูง	
2.	ใช้ผ้าสะอาดรองใต้คางผู้ป่วย	
3.	แนะนำผู้ป่วยให้ทำสัญญาเมื่อรู้สึกข้อนหรืออาเจียน เช่น ชูนิ้วชี้	
4.	เอาฟันปลอมออก (ถ้ามี) พร้อมวางขามรูปไตและกระดาษก๊อสดัดตัวผู้ป่วย	
5.	วัดระยะที่ควรใส่สายโดยวัดจากปลายจมูกหรือปาก ถึงดึ่งหูถึงปลายกระดูกอ่อน(Xyphoid process) ในเด็กวัดจากจมูกผ่านดึ่งหูถึงกึ่งกลางระหว่างลิ้นปี่กับสะดือใช้พลาสเตอร์พันไว้เป็นเครื่องหมาย	
6.	หล่อลื่นปลายสาย ลดการระคายเคือง ผู้ใหญ่ หล่อลื่นสายด้วยสารหล่อลื่นชนิดที่ละลายน้ำได้ เช่นวาสลีนเหลวเจลลี่ เด็ก หล่อลื่นด้วยน้ำสะอาด ทารก ไม่ต้องหล่อลื่น เพราะอาจสำลักและเกิดปอดอักเสบได้	
7.	ให้ผู้ป่วยตั้งศีรษะตรงหรือเงยหน้าเล็กน้อย	
8.	ค่อยๆสอดสายเข้าปากจนถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้	
9.	ตรวจสอบว่าสายเข้าไปในกระเพาะอาหารหรือไม่โดย -ใช้กระบอกฉีดยาข้อต่อ(Syring irrigate) ที่มีต่อกับปลายสายด้านนอกดูจะได้น้ำน้อย -ใช้เครื่องฟังตรวจบริเวณหน้าท้องส่วนบนและต้นลมประมาณ 5-10 มล. ในผู้ใหญ่ และ 1-3 มล. ในทารก ผ่านกระบอกฉีดขว้างแรงๆจะได้ยินเสียง -จุ่มปลายสายด้านนอกลงน้ำ ถ้าสาบเข้าหลอดลมจะมีอากาศผ่านออกมาตามจังหวะการหายใจ -ให้ผู้ป่วยออกเสียงหรือพูด ถ้าสายเข้าหลอดลมจะพูดไม่ได้	
ผู้บันทึก นางสาวนิกันต์ ม่วงพรหม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
หน่วยงาน ตึกผู้ป่วย 2		
ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง		
ลงชื่อ.....วันที่.....		