

## แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

## เรื่อง.....การใส่สายให้อาหาร.....

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม	
2	ล้างมือให้สะอาดและสวมถุงมือ	
3	จัดท่าผู้ป่วยในท่านั่ง หรือนอนศีรษะสูง (High fowler's position) เกิน 45องศาขึ้นไป	
4	วัดระยะที่สายยางเข้าถึงกระเพาะอาหารใน ผู้ป่วยผู้ดักจับปลายจมูกถึงติ่งหูจากติ่งหูถึงกระดูกซิฟอยด์(Xiphoid process)และที่ สัญลักษณ์ไว้	
5	หล่อลื่นสายด้วงสารหล่อลื่นยาวประมาณ 10-20 ซ.ม	
6	ให้ผู้ป่วยแน่นหน้าที่นีโอเล็กน้อยขณะใส่สาย เขากางจมูกค่อยๆ ใส่โดยไปตามโพรงจมูก เมื่อสายผ่านถึงคอให้ผู้ป่วยก้มศีรษะลงและ บอกรู้ป่วยช่วยกันลืนน้ำลาย	
7	เมื่อใส่สายลึกถึงตา แหงนที่ต้องการ ทดสอบ ว่าสายอยู่ในกระเพาะจริงหรือไม่ มีวิธีทดสอบที่นิยมมี 2 วิธี 7.1 ใช้กรอบกันน้ำ ต่อเข้ากับปลายสายยางแล้วดูด น้ำ ย่อจากกระเพาะอาหาร ถ้าดูดไม่ออกอาจมีการพับของสายหรือใส่สายไม่ลึกพอ อาจต้องเลื่อนสายให้ลึกมากขึ้น ให้ทดสอบด้วยวิธีที่ 7.2	
	7.2 ใช้กรอบกันน้ำที่มีข้อ ต่อ ดันลมประมาณ 5-10 cc ข้าไปในสายยางใช้หูฟังที่หน้าท้องตำแหน่งบริเวณกระเพาะอาหารและดูคลื่น	
8	ติดพลาสเตอร์ เหนียวให้อยู่ติดกับสันจมูก	
9	ล้างมือให้สะอาด	

ผู้บันทึก.....น.ส.ปริญญาภรณ์ ทองรอด.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพ.....

หน่วยงาน..... ตึก 2 ..... วันที่ ..... 27/6/2566 .....

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ..... วันที่..... ๒๗๕๘๖๖