


แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดการสำลักเศษอาหารเข้าหลอดลม

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	หลีกเลี่ยงเทคนิค General anesthesia	
2	ในกรณี Elective case ควรให้ผู้ป่วยงดอาหารและน้ำตาม Guideline เพื่อให้กระเพาะอาหารนั้นว่าง และให้ยาที่ลดความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกฤทธิ์	
3.	หลีกเลี่ยงการลด Laryngeal reflex จากการให้ Sedation หรือการให้ Topical anesthesia ที่ Larynx	
4.	ให้ Sodium citrate 30 ml. ก่อนการนำสลบ	
5.	ให้ H2 blocker อย่างน้อย 30 นาที ก่อนการนำสลบ เช่น Ranitidine 150 mg. oral หรือ 50 mg.IV	
6.	ให้ Metoclopramide 10 mg IV เพื่อเพิ่มการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเร็วขึ้น	
ผู้บันทึก	น.ส.ศิริวรรณ ไชยเดช	หน่วยงาน วิสัญญี
ความเห็น ผู้เกี่ยวข้อง	ลงชื่อ..... 	วันที่..... 26 มิ.ย 66