


แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน
เรื่อง การดูแลมารดาที่ได้รับยา Oxytocin เพื่อเร่งคลอด

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	ให้ยาตามแผนการรักษา โดยติดป้ายระบุชนิดของสารน้ำ ชนิดของยาที่ผสม ปริมาณที่ผสม ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ควบคุมจำนวนหยด และปรับ rate ตามแผนการรักษา	
2.	Monitor EFM ตั้งแต่เริ่มให้ยาเร่งคลอดจนถึงหลังทารกคลอด เพื่อสังเกต Fetal heart sound pattern	
3.	ดูแลจัดท่าตะแคงซ้าย เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่รก ลดการกดทับเส้นเลือด Inferior vena cava ลดการกดทับสายสะดือ	
4.	ในระยะ 15 นาทีแรกที่ให้ยา ต้องเฝ้าดูการหดตัวของมดลูก เพื่อประเมินความไวของกล้ามเนื้อมดลูกต่อยา ถ้าปกติแล้วให้ปรับเพิ่มจำนวนหยดยาทุกๆ 30 นาที โดยเพิ่มครั้งละ 10ml/hr จนกระทั่งมดลูกหดตัวดี คือหดตัวทุก 2-3 นาที หดตัวนาน 40-60 วินาที ความแรงระดับดี	
5.	ตรวจภายในเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดและบันทึกลง Pathograph	
6.	ถ้าพบสิ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ คือ มดลูกหดตัวห่างน้อยกว่า 2 นาที หดตัวนานเกิน 90 วินาที เสียงหัวใจทารกผิดปกติ ให้หยุดยาทันที และให้มารดานอนตะแคงซ้าย ให้ Oxygen mask with bag 10LPM ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์และรายงานแพทย์ทันที	
7.	สังเกตอาการแสดงของ Uterine rupture ได้แก่ อาการเจ็บครรภ์หายทันที ท้องโป่งตึง อืดท้อง คลำตัวทารกได้ชัดเจน เห็นรอยคอดสูงขึ้นระดับสะดือ หน้าท้องเป็นสองลอน หากพบอาการดังกล่าวรีบหยุดยา และรายงานแพทย์ทันที	



ผู้บันทึก น.ส. รัตติยา บุญแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 หน่วยงาน สตรีกรรม วันที่ 19 ส.ค. 66
 ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง
 ลงชื่อ อ.ม. ธีระวิ วันที่ 19 ส.ค. 66