แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การดูแลรักษา และเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในสมอง หลังได้รับ Rt-PA

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	ประเมินระบบประสาทด้วย Glassgow Coma Scale ทุก 15 นาที	
	ระหว่างที่ให้ยา rt-PA จนครบ 2 ชั่วโมง และ ทุก 30 ทที่ต่อเนื่องจนครบ 6 ชั่วโมง	
	และ ทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง หาก GCS ลดลง อาจเป็นเกณฑ์บ่งบอก	
	ถึงความผิดปกติของสมอง ควรสังเกตอาการปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน	
2.	ดูแลและควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 180/100 มิลลิเมตรปรอท	
	หากเกินกว่าที่กำหนดไว้ ควรรายงานแพทย์รับทราบ เพื่อประเมินอาการของผู้ป่วย	
	และให้ยาควบคุมความดันโลหิตตามแนวทางการรักษา เพราะอาจเป็นปัจจัยกระตุ้น	
	ให้เกิดภาวะเลือดออกทางสมองได้ ยาลดความดันโลหิตที่พิจารณาให้ คือ	
	Nicardipine 5 mg/hr titrate 0.25 mg/hr. q5-15 นาที หรือหากไม่	
	สามารถควบคุมได้ จะพิจารณาให้ sodium nitroprusside	
3.	หากรับยา rt-PA ครบ 24 ชั่วโมง การดูแลให้ได้รับการทำ เอกซเรย์ความพิวเตอร์	
	สมอง เพื่อประเมินภาวะเลือดออกในสมอง ที่ไม่แสดงอาการก่อนเริ่มยาต้านการ	
	รวมตัวของเกล็ดเลือด	

ผู้บันทึก นาย ภาสกร เล็กประดิษฐ์ **ตำแหน่ง** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน ER **วันที่** 8 ก.ค. 66

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง ขอเพิ่มเติมใน WI ของ ER

ลงชื่อ [illegible] **วันที่** 11 ส.ค. 66