

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างการรับความช่วยสัก

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	<p>1. เริ่มกดหน้าอกทันทีที่วินิจฉัยว่าหัวใจหยุดเต้น พบว่าการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้โอกาสฟื้นคืนชีพได้มากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องรอ จนหัวใจหยุดเต้นจึงกดหน้าอก เช่น กรณีหัวใจเต้นซ้ำๆ แรง ความดันเลือดต่ำมากหลังได้รับการทำ spinal block ถ้าให้การรักษาด้วยยา เช่น atropine adrenaline และไมเดซิ่น ให้ทำการกดหน้าอกทันที การกดหน้าอกจะช่วยให้ยาเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น ทำให้โอกาสฟื้นคืนชีพได้ดีขึ้น</p> <p>กรณีที่หัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในท่านอนหงาย เช่น ตะแคง คว่ำ ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย เอาผ้าคลุมผ่าตัดออกจากบริเวณหน้าอกเพื่อให้สามารถเข้าถึงและมองเห็นบริเวณที่ต้องกดหน้าอกได้อย่างชัดเจน และเริ่มกดหน้าอกทันทีที่เป็นไปได้</p> <p>2. ขอความช่วยเหลือ และขอให้มา defibrillator มา</p> <p>เมื่อทราบว่าเกิดปัญหา ควรรีบขอความช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะแจ้งให้แพทย์ผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดทราบปัญหาและให้ความช่วยเหลือ เนื่องจาก การช่วยฟื้นคืนชีพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องการผู้ช่วยในการทำหัตถการเพื่อการรักษา เช่น การกดหน้าอก การช่วยหายใจ การ shock การให้ยาและสารน้ำอย่างรวดเร็ว</p>	
ผู้บันทึก ตัวแทน	<p>น.ส. ปริศนา รัตนปัญญากร</p> <p>พยานาลวิชาชีพชำนาญการ</p>	
ความเห็น ผู้เกี่ยวข้อง	ลงชื่อ..... 	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างการระงับความรู้สึก

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	<p>. 3. หยุด anesthetic drugs ได้แก่ ยาدمสลบและยาสลบทางหลอดเลือดดำทั้งหมด</p> <p>4. ให้ 100% อออกซิเจน พร้อมกับเปลี่ยนปืนช่วยหายใจด้วย manual</p> <p>กรณีหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจด้วย mask โดยกดหน้าอกสลับกับช่วยหายใจในอัตรา 30 ต่อ 2 และใส่ท่อช่วยหายใจทันทีเมื่อพร้อม โดยรบกวนการกดหน้าอกให้น้อยลงสักที่สุดระหว่างการช่วยฟื้นคืนชีพ</p>	
ผู้บันทึก ตำแหน่ง	น.ส. ปริศนา รัตนปัญญากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
ความเห็น ผู้เกี่ยวข้อง	ลงชื่อ.....	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567