

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

การลดภาวะคลื่นไส้อาเจียน จากการระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	<p><b>เทคนิคของการให้ยาระงับความรู้สึก</b>            ที่อาจช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้</li> <li>2. หลีกเลี่ยงการอัดลมเข้าทางเดินอาหารขณะช่วยหายใจ</li> <li>3. รักษาระดับการสลบให้ตึกเพียงพอ</li> <li>4. รักษาหรือทดแทนภาวะขาดน้ำ</li> <li>5. ให้ยาแก้ปวดเพียงพอ เพราะความปวดสามารถทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้</li> <li>6. ให้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในการผ่าตัดที่มีความเสี่ยง</li> </ol> <p><b>การป้องกันและรักษา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถให้ยาป้องกันได้ โดยเฉพาะในรายที่มีปัจจัยเสริม เช่น meto-clopramide , Ondanzetron</li> <li>2. การแก้ไขสภาวะผิดปกติที่ทำให้เกิดอาการ เช่น อาการปวด แผล ความดันเลือดต่ำ ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง</li> </ol>	
ผู้บันทึก	น.ส. ปรีศนา รัตนปัญญากร	
ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
ความเห็น		
ผู้เกี่ยวข้อง	ลงชื่อ..... 	วันที่. 12 กุมภาพันธ์ 2567