การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เรื่อง การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	Hemorrhoidectomy เป็นการตัดหรือเย็บหรือผูกหัวริดสีดวงที่มีอาการ อาจเสริมด้วยการตกแต่งขอบทวาร เช่น ตัดติ่งหนังหรือขยายปากทวาร หรือตกแต่งแผลที่มีร่วมด้วย จะตัดออกไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	
	การเตรียมการผ่าตัด	
	1. ใช้ยาชาเฉพาะและทำในโรงพยาบาล	
	2. เตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
	3. ให้ยาระบาย และสวนทวารหนักก่อนการผ่าตัด	
	การดูแลรักษาหลังผ่าตัด	
	1. ให้ยาแก้ปวดตามความเหมาะสม	
	2. ให้ยาเพิ่มใยกากอาหาร และยาระบายหล่อลื่น	
	3. ใช้น้ำยาหลังถ่าย และอาจแช่น้ำอุ่น	
	4. ผู้ป่วยกลับบ้านได้ เมื่อไม่ปวดแผลมาก	
	ภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา	
	1. อาจมีเลือดออกได้ตั้งแต่หลังผ่าตัดจนถึงประมาณวันที่ 10 ปกติออกไม่มากและหยุดเอง	
	2. อาจมีน้ำเหลืองซึมที่ขอบทวาร 4-6 สัปดาห์ ในกรณีที่ไม่ได้เย็บปิดแผล	
	3. บริเวณปากทวาร อาจบวมเป็นติ่ง	
	ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบมาพบแพทย์	
	1. ถ่ายเป็นลิ่มเลือดปริมาณมากโดยไม่ค่อยมีอุจจาระออกมา	
	2. เจ็บแผลมาก มีไข้ ปวดตลอดเวลา มีน้ำเหลืองหรือหนองออกมาในปริมาณมาก	
	3. ไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ	

ผู้บันทึก นางสาวชนัญธิดา ไมนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน ห้องผ่าตัด วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ.....ธิดา ไม..... วันที่.....7 พ.ค. 67.....